

TOME LA INICIATIVA CON YORVIPATH

SI VIVE CON
HIPOPARATIROIDISMO,
REDEFINA LO POSIBLE



No es una paciente real

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Para qué se utiliza YORVIPATH®?

YORVIPATH es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar a adultos con niveles bajos de hormona paratiroidea (PTH) (hipoparatiroidismo).

- No se sabe si YORVIPATH es seguro y eficaz en personas a las que se les acaba de diagnosticar hipoparatiroidismo después de la cirugía o si se inicia en personas con niveles bajos de calcio en la sangre.
- No se sabe si YORVIPATH es seguro y eficaz en niños.
- YORVIPATH no se debe utilizar en niños y adultos jóvenes cuyos huesos aún están creciendo.

¿Quiénes no deben recibir YORVIPATH?

No utilice YORVIPATH si es alérgico a la palopegteriparatida o a cualquiera de los demás componentes de YORVIPATH.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Comprenda el hipoparatiroidismo y la PTH

El hipoparatiroidismo es una afección que se caracteriza por los bajos niveles o la falta de hormona paratiroidea (PTH).

La PTH ayuda a su organismo a regular el calcio mediante el envío de señales a órganos clave. Cuando se necesita más calcio, la PTH le permite hacer lo siguiente:



Estimular los huesos
para liberar calcio
almacenado



Aumentar la
absorción de calcio de
los alimentos en los
intestinos



Trasladar el calcio
de los riñones al
torrente sanguíneo

**“Vivir con
hipoparatiroidismo
significa que siempre
pienso en cómo mis
niveles de calcio
afectarán mi día”.**

– Lynette, paciente real

”

El tratamiento convencional por sí solo no aborda la PTH baja o ausente

Las fluctuaciones del calcio pueden causar una amplia variedad de síntomas.

✓ Marque los síntomas que experimenta con mayor frecuencia

Síntomas de calcio elevado en sangre

- ☐ Náuseas
- ☐ Vómitos
- ☐ Mareos
- ☐ Confusión

- ☐ Sensación de sed
- ☐ Debilidad muscular
- ☐ Latido cardíaco irregular

10.6 mg/dl

Intervalo normal de calcio en sangre

8.3 mg/dl

Calcio en sangre

Síntomas de calcio bajo en sangre

- ☐ Hormigueo en las yemas de los dedos, los dedos de los pies, los labios o la lengua
- ☐ Espasmos o calambres musculares

- ☐ Ritmos cardíacos anormales
- ☐ Convulsiones
- ☐ Entumecimiento bucal

- ☐ Depresión
- ☐ Problemas para pensar o recordar

¿Aún experimenta síntomas?

Si aún experimenta síntomas o sus resultados de análisis de laboratorio no coinciden con cómo se siente, puede que sea el momento de hablar con su médico sobre otra opción de tratamiento.

Consulte más preguntas importantes en la [página 13](#).

EL PRIMER Y ÚNICO TRATAMIENTO APROBADO POR
LA FDA PARA EL HIPOPARATIROIDISMO EN ADULTOS

YORVIPATH se diseñó para ayudar a proporcionarle a su organismo la PTH que necesita

CON LA ADMINISTRACIÓN DE PTH A LO LARGO
DE 24 HORAS, YORVIPATH PUEDE AYUDAR A:



Mantener niveles normales de
calcio en sangre



Mantener el movimiento normal
del calcio a través de los huesos,
la sangre y los órganos vitales



Activar la vitamina D para ayudar
con la absorción de calcio



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO


¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre YORVIPATH?

YORVIPATH puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Reacciones alérgicas (de hipersensibilidad)**, incluida la anafilaxia. Deje de tomar YORVIPATH y busque atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica: hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua; problemas respiratorios; desmayos; mareos; aturdimiento (presión arterial baja); latidos cardíacos rápidos; picazón; sarpullido o urticaria.
- **Niveles altos de calcio en sangre (hipercalcemia)**. YORVIPATH puede provocar que algunas personas tengan niveles de calcio en sangre más altos de lo normal. Su proveedor de atención médica debe revisar su nivel de calcio en sangre antes de comenzar y durante el tratamiento con YORVIPATH. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene náuseas, vómitos, mareos, sed, confusión, debilidad muscular o latidos cardíacos irregulares. La hipercalcemia tiene mayores probabilidades de ocurrir en los primeros 3 meses después de iniciar YORVIPATH, pero puede ocurrir en cualquier momento.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath[®]
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL



“

“Empecé a usar YORVIPATH porque ayuda a darle a mi cuerpo la PTH que necesita a lo largo del día, para que pueda concentrarme en lo que más me importa”.

– Chris, **paciente real**, con Heidi, cuidadora de Chris

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre YORVIPATH? (cont.)

- YORVIPATH puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen: Niveles bajos de calcio en la sangre (hipocalcemia). Las personas que omiten o cambian una dosis de YORVIPATH o dejan de usarlo pueden tener mayor riesgo de presentar niveles bajos de calcio en la sangre, pero la hipocalcemia puede ocurrir en cualquier momento. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene hormigueo en las yemas de los dedos, los dedos de los pies, los labios o la lengua; espasmos o calambres musculares; entumecimiento bucal; depresión; problemas para pensar o recordar; ritmos cardíacos anormales o convulsiones.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath[®]
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

YORVIPATH ofrece resultados para personas que viven con hipoparatiroidismo

CASI EL 70%

(68.9% frente al 4.8% con placebo) alcanzaron los objetivos del tratamiento mientras recibían YORVIPATH en la semana 26*¹

En un estudio clínico de 26 semanas de YORVIPATH, todos los participantes estaban recibiendo tratamiento convencional y, a continuación, se les asignó a recibir YORVIPATH (61 personas) o placebo (21 personas).²

Para considerar que respondían al tratamiento con YORVIPATH, las personas debían cumplir con **TODOS** estos criterios de tratamiento en la semana 26:

- ✓ Niveles normales de calcio en sangre
- ✓ Independencia del tratamiento convencional³ desde la semana 22
- ✓ Sin aumento de las dosis de YORVIPATH desde la semana 22
- ✓ Sin datos faltantes del tratamiento convencional desde la semana 22
- ✓ La dosis de YORVIPATH fue inferior o igual a 30 microgramos al día durante todo el estudio

*La inyección de placebo estaba diseñada para actuar como la inyección de YORVIPATH, pero sin ningún principio activo.

¹El objetivo del tratamiento con YORVIPATH es mantener niveles normales de calcio en sangre sin necesidad de vitamina D activa ni calcio (más de 600 mg al día). Se puede continuar con la suplementación de calcio necesaria para cubrir los requerimientos dietéticos diarios.

²Las dosis de YORVIPATH, placebo y tratamiento convencional fueron ajustadas por un médico en función de los niveles de calcio en sangre.

³La independencia del tratamiento convencional se definió como no recibir vitamina D activa ni calcio terapéutico (más de 600 mg al día de calcio elemental), sin dosis a demanda desde la semana 22, y sin datos faltantes sobre vitamina D activa o calcio después de la semana 22 del estudio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre YORVIPATH? (cont.)

YORVIPATH puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Posible cáncer de huesos (osteosarcoma).** Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene dolor en alguna parte del cuerpo que no desaparece o si nota algún bulto o hinchazón nuevo o inusual debajo de la piel que le duele al tocarlo. Estos son algunos de los signos y síntomas del osteosarcoma y es posible que su proveedor de atención médica deba hacerle pruebas adicionales.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath[®]
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Resultados de los objetivos individuales del estudio^{II}:

80% presentaron niveles normales de calcio frente al 48 % con placebo

93% no habían aumentado la dosis más allá de la semana 22 frente al 57 % con placebo

87% pasaron a ser independientes del calcio diario frente al 5 % con placebo

95% se independizaron de la vitamina D activa diaria frente al 24 % con placebo

El 91.8 % de las personas que recibieron YORVIPATH no recibieron más de 30 mcg diarios en ningún momento durante el estudio de 26 semanas.

En un estudio clínico, las personas que recibían YORVIPATH pudieron reducir el número medio de comprimidos de vitamina D activa y calcio que tomaban a diario



Todas las personas del estudio formaron parte de este análisis, incluidas aquellas que recibieron dosis de YORVIPATH de más de 30 microgramos al día en cualquier momento durante el estudio.

^{II}Al final del estudio, las personas que respondieron al tratamiento con YORVIPATH habían reducido su dosis media diaria de calcio a 600 mg o menos (sin tomar ninguna según fuera necesario) y habían eliminado su necesidad de vitamina D activa diaria. Una medida adicional de la eficacia fue que los pacientes que respondieron a YORVIPATH no tenían datos faltantes de vitamina D activa o calcio después de la semana 22 del estudio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Quiénes no deben tomar YORVIPATH?

No utilice YORVIPATH si ha tenido una reacción alérgica grave a la palopegteriparatida o a cualquiera de los demás componentes de YORVIPATH.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción y la Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath[®]
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

EN UN ESTUDIO CLÍNICO DE 26 SEMANAS DE DURACIÓN
EN PERSONAS CON HIPOPARATIROIDISMO,

YORVIPATH fue, por lo general, seguro y bien tolerado



EFFECTO SECUNDARIO MÁS FRECUENTE

Reacciones en el lugar de la inyección



OTROS EFECTOS SECUNDARIOS INCLUYERON

Disminución de la presión arterial o mareos al ponerse de pie, dolor de cabeza, diarrea, dolor de espalda, niveles altos de calcio en sangre y dolor de garganta



Nadie dejó de recibir YORVIPATH debido a efectos secundarios durante el estudio clínico de 26 semanas

Mientras reciba YORVIPATH, puede experimentar signos o síntomas de niveles bajos o altos de calcio en sangre. Si es así, debe comentarlos con su médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar YORVIPATH?

Antes de usar YORVIPATH, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Tiene mayor riesgo de padecer un tipo de cáncer de huesos llamado osteosarcoma. Esto es especialmente importante:
 - Si tiene una enfermedad de los huesos que aumenta el riesgo de desarrollar osteosarcoma (incluido si tiene la enfermedad de Paget).
 - Si un análisis de sangre indica que usted presenta aumentos inexplicables de la fosfatasa alcalina ósea.
 - Si tiene cáncer de huesos u otro cáncer que se ha extendido a los huesos.
 - Si está recibiendo o ha recibido radioterapia en el esqueleto.
 - Si tiene una enfermedad hereditaria que puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en los huesos.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath[®]
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Inyección
UNA VEZ AL DÍA
en una pluma cómoda
y lista para usar



Colaborará con su médico para encontrar la dosis adecuada para usted, empezando por la dosis de 18 microgramos. Su médico también ajustará sus dosis de calcio y vitamina D activa.



**Obtener más información
sobre la administración de
YORVIPATH a YORVIPATH.com**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar YORVIPATH? (Cont.)

Antes de usar YORVIPATH, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Toma medicamentos que contienen digoxina, que se utilizan para tratar la osteoporosis o que puedan afectar los niveles de calcio en la sangre.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath®
paleopecteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Obtenga asistencia personalizada a cada paso de su tratamiento



Una vez que se inscriba en A·S·A·P, tendrá acceso a un equipo de profesionales que le proporcionarán apoyo durante su tratamiento, lo que incluye:



Comprender la cobertura del seguro



Comenzar el tratamiento con un kit de inicio de YORVIPATH



Renovaciones de recetas y apoyo continuo para seguir por buen camino con YORVIPATH



Conectarse con un enlace de acceso del paciente (Patient Access Liaison, PAL)

Su PAL puede ayudarle a comprender su seguro y sus beneficios, saber más sobre su enfermedad y ver cómo YORVIPATH puede encajar en su plan de tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar YORVIPATH? (Cont.)

Antes de usar YORVIPATH, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si YORVIPATH provocará daños a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento con YORVIPATH.
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si YORVIPATH pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. YORVIPATH y otros medicamentos pueden interactuar entre sí y provocar efectos secundarios

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.


Yorvipath®
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Pague apenas \$5 al mes por su receta de YORVIPATH*



Si tiene seguro médico comercial y es elegible, puede pagar apenas \$5 al mes por YORVIPATH*

Si no tiene seguro o su seguro es insuficiente, puede ser elegible para el tratamiento por \$0 a través del Programa de Asistencia al Paciente (PAP) de Ascendis.†



Visite [YORVIPATH.com](https://www.yorvipath.com) para obtener más información sobre el apoyo personalizado con A·S·A·P

Para hablar con un miembro de nuestro equipo de apoyo o ponerse en contacto con un PAL, llame al **1-844-442-7236** (de 8 a. m. a 8 p. m. ET, de lunes a viernes).

*Se requiere elegibilidad. Los beneficiarios federales y estatales de atención médica no son elegibles (participantes en programas como Medicaid, Medicare, Medigap, VA, DOD o TRICARE). La oferta no es válida para pacientes que pagan en efectivo. Se aplican términos y condiciones.

†Se aplican términos, condiciones y criterios de elegibilidad completos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YORVIPATH?

YORVIPATH puede provocar efectos secundarios graves:

- **Disminución de la presión arterial cuando cambia de posición (hipotensión ortostática).** Algunas personas pueden sentir mareos, tener latidos cardíacos rápidos o sentir aturdimiento inmediatamente después de recibir la inyección de YORVIPATH. Para las primeras dosis, administre la inyección de YORVIPATH en un lugar donde pueda sentarse o acostarse inmediatamente si presenta estos síntomas. Si los síntomas empeoran o no desaparecen, póngase en contacto con su proveedor de atención médica antes de continuar usando YORVIPATH.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath®
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Las personas reales que viven con hipoparatiroidismo están tomando la iniciativa

“

“Hasta ahora, la mayor diferencia es que siento que soy capaz de manejar de forma más predecible mi hipoparatiroidismo”.

– Joanna, paciente real



Escuche más historias de personas como usted en [YORVIPATH.com](https://www.yorvipath.com)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YORVIPATH? (Cont.)

YORVIPATH puede provocar efectos secundarios graves:

- **Toxicidad por digoxina si está usando digoxina y YORVIPATH al mismo tiempo.** Informe a su proveedor de atención médica si experimenta ritmo cardíaco irregular, palpitaciones, confusión, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, diarrea o problemas de visión.

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath®
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

Dedique un momento a reflexionar sobre cómo se siente y sus objetivos para manejar el hipoparatiroidismo

¿Cómo calificaría cómo se siente actualmente a diario?



MENTALMENTE

☐

☐

☐

☐

☐

FÍSICAMENTE

☐

☐

☐

☐

☐

EMOCIONALMENTE

☐

☐

☐

☐

☐

¿En qué medida el consumo de calcio y vitamina D activa afecta su vida diaria?

☐ NUNCA

☐ RARA VEZ

☐ A VECES

☐ CON FRECUENCIA

En promedio, ¿con qué frecuencia los síntomas de calcio alto y bajo afectan su vida diaria?

☐ NUNCA

☐ RARA VEZ

☐ A VECES

☐ CON FRECUENCIA

¿Qué tan bien cree que puede controlar su hipoparatiroidismo?



☐

☐

☐

☐

☐

Cuando se trata de controlar su hipoparatiroidismo, ¿tiene algún objetivo hacia el que esté trabajando?

Notas o temas adicionales que le gustaría compartir con su médico:

Averigüe si YORVIPATH podría ser adecuado para usted



Administración de PTH las 24 horas



Mantiene niveles normales de calcio en sangre durante 24 horas



Apoyo personalizado durante todo el tratamiento con la inscripción en A·S·A·P

¿Listo para *redefinir lo posible* con hipoparatiroidismo?

Pregunte a su médico por el inicio de YORVIPATH



Más información en
[YORVIPATH.com](https://www.yorvipath.com)

Los pacientes reales recibieron una compensación de Ascendis Pharma.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y USO

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de YORVIPATH? (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de YORVIPATH incluyen reacciones en el lugar de inyección, signos o síntomas de vasodilatación, como disminución de la presión arterial o mareos al ponerse de pie, dolor de cabeza, diarrea, dolor de espalda, niveles elevados de calcio y dolor de garganta.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de YORVIPATH. Consulte con su médico para que lo asesore sobre los efectos secundarios. **Se recomienda informar sobre los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. También puede notificar efectos secundarios a Ascendis Pharma llamando al 1-844-442-7236.**

Consulte la Información importante de seguridad que se encuentra a lo largo de este documento. Haga clic para leer o imprimir la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de YORVIPATH.

Yorvipath® 
palopegteriparatide
Injection 300 mcg/mL

ascendis
pharma 

© Septiembre 2026 Ascendis Pharma Endocrinology, Inc. Todos los derechos reservados. YORVIPATH®, Ascendis Signature Access Program®, Ascendis® y el logotipo de Ascendis Pharma y de la compañía son marcas comerciales propiedad de Ascendis Pharma Group. US-COMMPH-2600209 09/26